

## Zitterbewegung in monolayer Silicene

E. Romera<sup>1</sup>, J. B. Roldan<sup>2</sup> and F. de los Santos<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear and  
Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional, Universidad de  
Granada, Fuentenueva s/n, 18071 Granada, Spain

<sup>2</sup>Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores & CITIC,  
Universidad de Granada. Fuentenueva s/n, 18071 Granada, Spain.

<sup>3</sup>Departamento de Electromagnetismo y Física de la  
Materia, and Instituto Carlos I de Física Teórica y  
Computacional, Universidad de Granada, Fuentenueva s/n, 18071 Granada,  
Spain  
eromera@ugr.es

### Abstract

We have studied the current oscillations due to ZB in Silicene in a magnetic field by considering wave packets with a Gaussian population of both positive and negative energy levels. The ZB time is compared with other periodicities namely the classical period  $T_{Cl}$  and the revival times  $T_R$ . As in previous studies [1,2,3,4] we find  $T_{ZB} < T_{Cl} < T_R$ . A comparison of these phenomena with MoS<sub>2</sub> and grapheme has been analyzed.

### References

- [1] E. Romera and F. de los Santos, Phys. Rev. B **80** 165416 (2009).
- [2] T. García, N. A. Cordero and E. Romera, Phys. Rev. B, **89**, 075416 (2014).
- [3] T. García, S. Rodríguez-Bolívar, N. A. Cordero and E. Romera, J. Phys. Condens. Matter. **25**, 235301 (2013).
- [4] E. Romera, J. B. Roldán and F. de los Santos, Phys. Lett. A **378**, 2582 (2014).